

## **Gyomor röntgen vizsgálat, vékonybél-passzázs vizsgálat**

A nyelőcső, a gyomor, a nyombél és a vékonybelek belső felszínét tesszük lázhatóvá, és az ott előforduló kóros elváltozásokat vizsgáljuk.

A vizsgálat során kontrasztanyagot kell innia, esetenként pezsgőport is adunk. A pezsgőpor gázt fejleszt a gyomorban, falát kifeszíti így felszíne jobban látható. Amennyiben a fal ellazítására van szükség, vénásan vagy izomba injekciót is kaphat. Kérjük, hogy amíg a vizsgálat első része tart, (kb. 20 perc) ne bőföggje fel a gázt, mert akkor rosszabb minőségű képet kapunk. A teljes vizsgálat időtartama egyébként legalább egy óra, mert értékelni kell azt is, hogy a kontrasztanyag milyen ütemben ürül a gyomorból, és a bélrendszer mely szakaszáig jut el ez alatt. Abban az esetben pedig, ha a kezelőorvos vékonybél-passzázs vizsgálatot tart szükségesnek, kísérnünk kell a kontrasztanyagot a vékonybélrendszeren át a vastagbelekig, ez kb. két-három óráig is eltarthat.

Előkészítés:

Előző nap éjféltől ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon. A gyógyszereit is csak akkor vegye be, ha a kezelőorvos előírása szerint mindenképpen szükséges.

Cukorbetegség esetén: az időpontkérésnél, illetve a vizsgálatra való megjelenésnél munkatársainknál jelezze betegségét. Hozza magával a gyógyszerét, és a hozzá szükséges mennyiségű enivalót, a vizsgálat után ezeket beveheti, ill. elfogyaszthatja.

A vizsgálat után bármit ehet, ihat. A következő napokban a kontrasztanyag miatt széklete világosabb lesz.

Fontos tudnia, hogy míg a kontrasztanyag nem ürült ki, addig számos vizsgálat nem végezhető eredményesen (pl. hasi CT, hasi ultrahang, vese kontrasztanyagos röntgenvizsgálata, ágyéki gerinc, és medence rtg. vizsgálata, gyomor-bélrendszeri vizsgálatok)

Nőbetegeink mindig előre jelezzék, ha terhesek!

Az előző vizsgálatok, kezelések leleteit, zárójelentéseit mindig hozza magával! Amennyiben valamely előző vizsgálaton a felvételt kézhez kapta, azt szintén hozza el!